Tratamiento de cetonas con bomba y/o días de malestar

Cuando el nivel de azúcar en sangre es mayor de 250 o se siente mal
 Mi hijo **puede** comer y beber **CON LA BOMBA**

Nivel de cetonas	Análisis de azúcar en sangre	Análisis de cetonas	Alimentos y bebidas	Tratamiento	Insulinas
NEGATIVO Cetonas < 0.6 (Nivel de azúcar > 250 mg/dL)	Evaluar como siempre (aunque el nivel de azúcar en sangre > 250 mg/dL)	CONTROLAR el nivel de cetonas cada 4 horas. Si el nivel de cetonas es mayor de 0.6, administrar una inyección de insulina y volver a analizar las cetonas en 2 horas. Si el nivel de cetonas es mayor de 1.5, administrar una inyección de insulina y volver a analizar las cetonas en 1 hora. Si el nivel de cetonas es mayor de 3.0, administrar una inyección de insulina y volver a analizar las cetonas en 1 hora. Si el nivel de cetonas es mayor de 4.0, administrar una inyección de insulina y volver a analizar las cetonas en 1 hora. Si el nivel de cetonas es mayor de 6.0, administrar una inyección de insulina y volver a analizar las cetonas en 1 hora. Si el nivel de cetonas es mayor de 8.0, administrar una inyección de insulina y volver a analizar las cetonas en 1 hora. Si el nivel de cetonas es mayor de 10.0, administrar una inyección de insulina y volver a analizar las cetonas en 1 hora.	Permitir que el niño coma y beba lo que quiere, siempre que sea seguro.	VIGILAR el nivel de azúcar en sangre cada 2 horas. Si el nivel de azúcar en sangre es mayor de 250 mg/dL, administrar una inyección de insulina y volver a analizar el nivel de azúcar en sangre en 1 hora.	SEGUIR administrando insulina con la bomba. Si el nivel de azúcar en sangre es mayor de 250 mg/dL, administrar una inyección de insulina y volver a analizar el nivel de azúcar en sangre en 1 hora.
ENTRE MÍNIMO Y BAJO Cetonas 0.6 - 1.5 (Nivel de azúcar > 250 mg/dL)	Cada 2 horas	CONTROLAR el nivel de cetonas cada 4 horas. Si el nivel de cetonas es mayor de 0.6, administrar una inyección de insulina y volver a analizar las cetonas en 2 horas. Si el nivel de cetonas es mayor de 1.5, administrar una inyección de insulina y volver a analizar las cetonas en 1 hora.	Permitir que el niño coma y beba lo que quiere, siempre que sea seguro.	ADMINISTRAR una inyección de insulina CADA 2 HORAS . Si el nivel de azúcar en sangre es mayor de 250 mg/dL, administrar una inyección de insulina y volver a analizar el nivel de azúcar en sangre en 1 hora.	SEGUIR administrando insulina con la bomba. Si el nivel de azúcar en sangre es mayor de 250 mg/dL, administrar una inyección de insulina y volver a analizar el nivel de azúcar en sangre en 1 hora.
ENTRE MODERADO					

Aunque el nivel de azúcar en sangre sea menor de 250, siga controlando las cetonas y usando el cuadro hasta que el análisis de cetonas sea NEGATIVO.
 Si el nivel de cetonas no mejora después de 3 inyecciones, llame al 901-287-6659 para obtener ayuda.